



적용병해충 및 사용량

병뚜껑의 용량 : 약 16mL

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물200당 사용약량
사과	화상병	개화초기부터 7일 간격 경엽처리	10mL
배			
상추 (양상추 포함)	균핵병	발병초 7일 간격 경엽처리	20mL
딸기	잿빛곰팡이병		
오이			
토마토 (방울토마토 포함)			
포도			

특 징

- ① 이 농약은 생화학농약으로 식물추출물을 주성분으로 하는 천연산물 보호제로 꿀벌 및 환경에 안전합니다.
- ② 이 농약은 토양 및 작물에 대한 잔류 문제가 없어 수확당일에도 안전하게 사용할 수 있습니다.

안전 및 기타 주의사항

- ① 약을 뿌릴 때에는 마스크, 고무장갑, 보안경 방제복을 착용하고 바람을 등지고 뿌리
되 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오
- ② 사용 후 남은 희석액과 살포기를 씻은 물은 하천 등에 흘러 들어가지 않도록 안전
하게 처리하십시오
- ③ 병뚜껑을 열 때 신체(눈, 코, 입, 피부 등)에 내용물이 묻지 않도록 주의하십시오.
- ④ 신체에 이상(감기, 알레르기, 임신, 천식, 피부병 등)이 있을 때는 약제 살포 및
취급을 금합니다.
- ⑤ 본 제품은 농약이므로 다른 용기에 옮겨 보관하지 마십시오
- ⑥ 이 농약은 잘 밀봉한 뒤 햇빛을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오

사용방법

- ① 이 농약은 발병전 또는 발병초기에 살포하여 주십시오.
- ② 이 농약은 점도가 있지만 물에 희석시 잘 저어주거나 교반하면 잘 녹습니다.
- ③ 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후 분무기 및 살포기를 이용하여 작물
에 충분히 묻도록 뿌리십시오.
- ④ 표기내용 표시사항이 이해가 되지 않거나 문의사항이 있을 경우에는 한국삼공(주)
에 문의하여 주십시오.

약효·약해 주의사항

- ① 이 농약을 섞어 뿌리고자 할 때에는 반드시 당해년도에 한국삼공(주)에서 제공한
농약혼용가부표를 확인하여야 하며, 혼용이 불가능하거나 혼용가부표에 없는
경우에는 절대로 섞어 뿌리지 마십시오.
- ② 살포 전·후 살포기를 반드시 씻으십시오.

※적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오.

취급제한기준

이 농약은 의약품, 식료품 또는 사료의 보관장소와 구분하여 보관하십시오.

농기에서 사용한 빈 농약용기를 마을 수집함에 모아두면 한국환경공단에서 수거하고 있습니다.(한국환경공단에서 현금 지급함) (배출 및 수거안내 : 1661-6620)

※농약을 정해진 용도로 사용하지 않을 경우 「농약관리법」에 따라 과태료가 부과되며, 직불금 수령 등에 불이익을 받을 수 있음

성 분 (품목명 : 블라드 액제)

유효성분 : BLAD20%
기 타 : 계면활성제, 부성분, 용제 80%

약효보증기간 : 25.10.21 까지

수입모집단번호 : 2210-001



살균제
미분류

농약

등록번호:14-살균-36
저독성(어독성Ⅲ급)



프로블라드

품목명 : 블라드 액제

주의 | 사용 전에 표기내용을 확인하여 표시사항 이외에는 사용
하지 말고 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 말 것

•중독증상이 있을 때는 즉시 작업을 중지하고 안정을 취할 것이며 의사의 지시를 받으십시오.
•농약을 섭취하였을 경우 억지로 구토 시키지 말고 즉시 의사의 치료를 받으십시오.
고객상담 T.080-899-3030 지점대표전화 T.1599-3082

수입원/판매원 :



제조원 :

CEV. S. A. (포르투갈)

250mL



마스크착용



고무장갑착용



보안경착용



방제복착용

200

150

100

50